

OVULĀCIJAS TESTS

Maria Before Baby ir paredzēts paštestēšanai un kā kvalitātīvs *in vitro* pārbaudes diagnostikas tests, lai noteiktu, kad ir luteinīzējošā hormona (LH) izdalīšanās maksimums, kā arī to, kad jums varētu būt ovulācija.

Lietošanai tikai *in vitro* diagnostikai. Lietošanai tikai paštestēšanai.

KĀ TAS DARBOJAS?

Veselas sievietes urīnā esošais luteinīzējošā hormona (LH) daudzums menstruālā cikla vidū strauji palieeinās. LH daudzuma palieeināšanās ierosina ovulāciju – procesu, kad no olnīcas izdalās nobriedusi olšūna. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperti norāda, ka LH testēšana ir drošs ovulācijas noteikšanas veids. Ovulācijai būtu jānotiek 24–48 stundas pēc pozitīvu testa rezultātu iegūšanas.

Kad uz testa ierīces absorbenta nonāk urīna paraugs, kapilārās darbības rezultātā tas pārvietojas pa membrānu. Kad paraugā esošais LH sasniedz membrānas testa zonu, tas izveido krāsainu joslu. Ja šīs krāsainās joslas nav, tas nozīmē, ka rezultāts ir negatīvs.

Procedūras kontroles nolūkos krāsainā josla parādīties kontroles zonā, ja tests ir veikts pareizi.

Tests nosaka ovulāciju ar augstu precizitāti. Tas ir vērtīgs instruments, jo nosaka periodu, kad ir vislabākie nosacījumi olšūnas un spermatozoīda saplūšanai.

Dažādu apstākļu, emociju un citu dzīves aspektu dēļ ovulācija var būt neregulāra. Jūs nevarat pieņemt, ka ovulācija vienmēr notiks vienā un tajā pašā laikā pēc menstruācijām. Tādēļ jums tā ir atkārtoti jātestē katrā menstruālajā ciklā.

TESTA KOMPLEKTA SATURS

- Atsevišķi hermētiski maisiņi, kuros ir:
 - urīna testa ierīce
 - maisiņš ar mitruma uzsūcēju (mitruma uzsūcējs ir paredzēts tikai glābšanas mērķiem un netiek izmantots testa procedūrās).
- Instrukcija ar lietošanas norādījumiem.

KAS VĒL JUMS IR VAJADZĪGS?

- Tirs, sauss plastmasas vai stikla konteiners urīna savākšanai.
- Taimeris (rokas vai sienas pulkstenis).

PIESARDĀĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Šīs komplekts nav paredzēts iekšķigai lietošanai. Nenorīt.
- Ar visiem paraugiem jārīkojas kā ar bioloģiski bīstamu vielu.
- Izmest pēc pirmās lietošanas. Urīna testa ierīci var lietot tikai vienu reizi.
- Nelietot testa komplektu, kuram ir beidzies derīguma termiņš.
- Nelietot testa komplektu, ja maisiņš ir pārdurts vai nav rūpīgi noslēgts.
- Uzglabāt bēriņiem nepieejamā vietā.
- Vīsi paraugi un izlietotās ierīces rada inficēšanās risku. Izlietotais testa komplekts jāiznīcina atbilstoši vietējiem noteikumiem.

GLĀBĀŠANA UN STABILITĀTE

- Uzglabāt 4°C–30°C temperatūrā.
- Testa ierīces neatvērtā iepakojumā ir stabils līdz derīguma termiņa beigām, kas uzdrukāts uz iepakojuma.
- Sargāt no tiešiem saules stariem, mitruma un karstuma.
- Testa ierīce ir jāizlieto vienas stundas laikā pēc atvēršanas.
- NESASALDĒT.**

KAD SĀKT TESTĒŠANU

Menstruālā cikla ilgums ir laiks no jūsu menstruālās asinošanas pirmās dienas līdz dienai pirms nākamās asinošanas sākšanās. Pirms testa nosakiet menstruālā cikla ilgumu. Skatīt tabulu tālāk, lai noteiktu, kad jums būtu jāsāk testēšana. Ja jūsu cikls ir īsāks par 21 dienu vai ilgāks par 38 dienām, konsultējieties ar ārstu. Ja jūs nezināt savu cikla ilgumu, jūs varat sākt testu 11 dienas pēc jūsu menstruālās asinošanas pirmās dienas, jo videjais cikla ilgums ir 28 dienas. Veiciet 1 testu katru dienu tik ilgi, kamēr ir noteikts LH maksimums. Parasti nepieciešams veikt (3–6) testus viena cikla laikā.

Cikla ilgums	Cikla diena, kad sākt testu
21 diena	5. diena
22 dienas	6. diena
23 dienas	7. diena
24 dienas	8. diena
25 dienas	9. diena
26 dienas	10. diena
27 dienas	11. diena
28 dienas	12. diena
29 dienas	13. diena
30 dienas	14. diena
31 diena	15. diena
32 dienas	16. diena
33 dienas	17. diena
34 dienas	18. diena
35 dienas	19. diena
36 dienas	20. diena
37 dienas	21. diena
38 dienas	22. diena
39 dienas	23. diena
40 dienas	24. diena

Cikla tabula

Piemērs: Ja jūsu cikls parasti ir divdesmit sešas dienas, cikla tabula norāda, ka testēšana ir jāsāk 10. dienā. Šajā kalendārā parādīts, kā noteikt 10. dienu.

Kalendāra paraugs

1	2	3 + 1.diena	4	5	6	7
8	9	10	11	12# 10. diena	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28


3+ = pirmā menstruālās asinošanas diena
12# = diena, kad jāsāk testēšana (10. diena)

KAD IR JĀSAVĀC URĪNS TESTAM?

Ovulācijas testēšanai ir piemērots jebkurā diennakts laikā nemitīs urīns.

KĀ VEIKT TESTU

- Lai sāktu testēšanu, atveriet vienu noslēgto paciņu, atplēšot pa ieroboto vietu. Izņemiet urīna testa ierīci no paciņas.
- Ar vienu roku turiet testa ierīces apaļo galu, ar otru roku novelciet nost vāciņu un atsedziet absorbenti.
- Pagrieziet absorbenta galu uz leju; vismaz uz 10 sekundēm ievietojet absorbenta galu urīna plūsmā, lai absorbents būtu pilnībā mitrs. Urīnejot neļaujiet urīnam pārsniegt bultas atzīmi. Jūs varat arī savākt savu urīnu tirā traukā un vismaz uz 3 sekundēm absorbenti iegredēt urīnā.
- Uzlieciet testa ierīcei vāciņu un gaidiet, kamēr parādās krāsainas joslas. **Nolasiet rezultātu piecu minūšu laikā. Nenosiet rezultātu pēc tam, kad ir pagājušas 5 minūtes.**



KĀ NOLĀSĪT REZULTĀTUS?

Negatīvs rezultāts (nav LH maksimums): kontroles zonā parādās tikai viena krāsaina josla vai parādās testa josla, bet tā ir gaišāka nekā kontroles josla. Tas nozīmē, ka nav LH maksimums.

Pozitīvs rezultāts (ir LH maksimums): ja ir redzamas divas krāsainas joslas, un testa josla ir vienāda vai tumšāka nekā kontroles josla, jūs iespējams nākamajās 24–48 stundās būs ovulācija. Ja censēties palikt stāvoklī, vislabākais dzimumumakta laiks ir pēc 24 stundām, bet ne vairāk kā pēc 48 stundām.

Nederīgs rezultāts: vispār nav redzama krāsainā josla. Atkārtojiet testu ar jaunu testa komplektu. Ja tests joprojām neizdodas, sazinieties ar produkta izplatītāju, norādot partijas numuru.



IEROBEŽOJUMI

- Tests darbojas tikai tad, ja ir ievērotas testa lietošanas instrukcija.
- Šo testu nevar izmantot kā kontracepcijas veidu.
- Jums ir neregulārs vai ilgs menstruālais cikls, konsultējieties ar ārstu.

RAKSTURIELUMI

JUTIGUMS UN PRECIZITĀTE

Ovulācijas tests Maria Before Baby noteiks LH cilvēka urīnā līmenī augstākā nekā 25 mS/V/ml. Testu precizitāte 99,8%.

TRAUCĒJOŠĀ VIELA

LH negatīvam un LH pozitīvam paraugam tika pievienotas šādas potenciāli traucējošas vielas:

acetaminofēns	20mg/dl	gentisikskābe	20mg/dl
acetsalīcīlskābe	20mg/dl	glīkoze	2g/dl
askorbīnskābe	20mg/dl	hemoglobīns	20mg/dl
atropīns	20mg/dl	tetraciklīns	20mg/dl
kofeīns	20mg/dl	ampicilīns	20mg/dl

Neviena no vielām testētajās koncentrācijās netraucēja pārbaudei.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

- Ir liela atšķīiba starp divu testu kontroles joslām. Vai par to būtu jāuztraucas?* Nē. Atšķirīgas kontroles joslas krāsas neietekmēs testa rezultātu. Lietderīgi ir salīdzināt tikai tās pāsās ierīces testa joslas krāsu ar kontroles joslas krāsu testa veikšanas dienā.

- Vai testa rezultātus var interpretēt pēc tam, kad ir pagājušas vairāk nekā piecas minūtes?* Nē. Testa rezultāti ir jānolasa 5 minūšu laikā. Lai gan pozitīvam rezultātam nebūtu jāmaiņas vairākas dienas, negatīvs rezultāts dažas minūtes pēc testēšanas perioda beigām var mainīties uz nepatieši pozitīvu rezultātu, kas nebūtu precīzs rādījums. Vienmēr vislabāk ir nolasīt rezultātus testēšanas perioda piekāpj minūtē un pēc tam izmest testu, lai izvairītos no sajaukšanās.
- Cik ilgi man būtu jāturpina veikt tests?* Veiciet 1 testu katru dienu tik ilgi, kamēr ir noteikts LH maksimums. Parasti nepieciešams veikt (3–6) testus viena cikla laikā.

- Testēšanas perioda laikā rezultātu zonā parādījās roža fona krāsa un vertikālās svītras. Vai par to būtu jāuztraucas?* Nē. Katrā urīna parauga kārīmās sastāvās un testēšanas telpas gaisa mitrums būs atšķirīgs. Šādas fiziskās svītras var radīt vertikālās svītras un/vai roža fona krāsu, bet neietekmēs testa rezultātus. Ja dažu minūšu laikā parādās kontroles josla, tests darbojas pareizi.

- Vai alkohols vai parastās zāles ietekmē testu?* Nē. Bet jums būtu jākonsultējas ar savu ārstu, ja lietojat kādas zāles.

- Ja es redzu pozitīvu rezultātu, kad būtu vislabākais laiks dzimumumaktam?* Ovulācija varētu rasties 24–48 stundu laikā. Tas ir jūsu visauglīgākais laiks. Dzimumumakts ir ieteicams šajās laikā robežās.

- Es tagad izmantoju kermenā bazālās temperatūras (BT) metodi. Vai šis tests aizstāj BT metodi?* Kermenā bazālās temperatūras pauaugstināšanās galvenokārt norāda, ka ovulācija jau ir sākusies. Savukārt, šis tests norāda, kad ovulācija varētu sākties.

- Es ieguvu pozitīvu rezultātu, un man bija dzimumumaks auglīgājais dienās. Es nepaliku stāvoklī. Kas man jādara?* Jūs spēju klūt stāvoklī var ietekmēt dažādi faktori. Jums varētu būt nepieciešams izmantot testa komplektu 3–4 mēnešus. Ja nepaliiekat stāvoklī pēc 3–4 mēnešiem, jums un jūsu partnerim būtu jākonsultējas ar savu ārstu.

- Vai šķidruma daudzums, ko es izdzeru, ietekmē testa rezultātu?* Mēs iesakām jums ierobežot šķidruma uzņemšanu apmēram divas stundas pirms tam, kad jūs savācat urīnu. Šķidruma uzņemšana lielā daudzumā pirms testa veikšanas atšķaidīs hormonu jūsu urīnā.

IVD	Lietot <i>in vitro</i> diagnostēšanai		Uzglabāt 4–30°C
	Lietošanas instrukcija		Ražotājs
EC/REP	Pilnvarotais pārstāvis ES		Neizmantot atkārtoti
LDT	Partī		Izlietot līdz
REV	Revizijas numurs		
CE 0537	Šis produkts atbilst Direktīvas 98/79/EC prasībām par <i>in vitro</i> diagnostējošām medicīniskajām ierīcēm		

Ražotājs: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No.8, Lishinan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, Ķīna.

EC/REP Pilnvarotais pārstāvis ES:

Qarad b.v.b.a., Cipalstraat 3, B-2440 GEEL, Beļģija.

Izplatītājs: SIA "ELVIM", Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067, Latvija. Tel.: +371 67 808440.



ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

Maria Before Baby предназначен для самостоятельного тестирования и является качественным *in vitro* диагностическим тестом для вычисления периода максимального выделения лютеинизирующего гормона (ЛГ), а также возможного начала Вашей овуляции. Применять только для *in vitro* диагностики. Применять только для самостоятельного тестирования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Количество находящегося в моче здоровой женщины лютеинизирующего гормона (ЛГ) в середине менструального цикла резко увеличивается. Увеличение количества ЛГ свидетельствует об овуляции – процессе выхода зрелой яйцеклетки из яичников. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что ЛГ тестирование помогает точно определить начало овуляции. В норме овуляция должна произойти через 24-48 часов после получения положительного результата на тест.

Попадая на абсорбент теста, проба мочи в результате капиллярного действия перемещается по мембрane. Когда находящийся в пробе ЛГ достигает тестовую зону мембрane, он образует цветную полоску. Отсутствие цветной полоски означает, что результат отрицательный.

Если тест проведен правильно – цветная полоска появится и в контрольной зоне.

Тест с высокой точностью определяет начало овуляции и является ценным инструментом, так как помогает вычислить оптимальный период для слияния сперматозоида и яйцеклетки.

В силу разных обстоятельств, эмоций и других жизненных аспектов овуляция может быть нерегулярной. Вы не можете рассчитывать на то, что овуляция всегда произойдет в одно и то же время после менструаций, поэтому этот тест должен проводиться повторно во время каждого менструального цикла.

В СОСТАВ ТЕСТ-КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- Отдельные герметические мешочки, в которых находятся:
 - тест для мочи
 - мешочек с поглотителем влаги (поглотитель влаги предназначен только для обеспечения хранения и не используется для проведения теста).
- Инструкция по применению.

ЧТО ВАМ ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ

- Чистый, сухой пластмассовый или стеклянный контейнер для мочи.
- Таймер (ручные или настенные часы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Комплект не предназначен для внутреннего применения. Не глотать.
- Со всеми проблемами обращаться, как с биологически опасными веществами.
- Выбросить после первого использования. Тест для мочи можно использовать только один раз.
- Не использовать тест-комплект с истекшим сроком годности.
- Не использовать комплект, если мешочек прорыжен или неплотно закрыт.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Все пробы и использованные приборы создают риск заражения. Использованный тест-комплект должен быть уничтожен в соответствии с местными правилами.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- Хранить при температуре 4°C~30°C.
- Тесты в запечатанной упаковке стабильны до истечения указанного на упаковке срока годности.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, влаги и высоких температур.
- Тест должен быть использован в течение одного часа после открытия упаковки.
- НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.**

КОГДА НАЧИНАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ

Менструальный цикл длится с первого дня менструального кровотечения до дня перед началом следующего кровотечения. Перед проведением теста определите продолжительность менструального цикла. См. приведенную далее таблицу для определения начала тестирования. Если ваш цикл длится менее 21 дня или более 38 дней, проконсультируйтесь с врачом. Если Вы не знаете продолжительность своего цикла, Вы можете начать тестирование через 11 дней после первого дня менструального кровотечения, так как

средняя продолжительность цикла – 28 дней. Проводите по 1 тесту каждый день, пока не определите максимальный уровень ЛГ. Как правило, в течение одного цикла необходимо сделать 3-6 тестов.

Таблица цикла

Продолжительность цикла	День цикла, когда начинать тестирование
21 день	5 день
22 дня	6 день
23 дня	7 день
24 дня	8 день
25 дней	9 день
26 дней	10 день
27 дней	11 день
28 дней	12 день
29 дней	13 день
30 дней	14 день
31 день	15 день
32 дня	16 день
33 дня	17 день
34 дня	18 день
35 дней	19 день
36 дней	20 день
37 дней	21 день
38 дней	22 день
39 дней	23 день
40 дней	24 день

Пример: Если обычно Ваш цикл длится двадцать шесть дней, согласно таблице тестирование необходимо начинать на 10-ый день. В календаре ниже показано, как определить 10-ый день.

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРЯ

1	2	3 + 1-ый день	4	5	6	7
8	9	10	11	12# 10-ый день	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

3+ = первый день менструального кровотечения


12# = день, когда начинать тестирование (10-ый день)

КОГДА БРАТЬ ОБРАЗЕЦ МОЧИ

Для проведения теста на овуляцию пригоден образец мочи, взятый в любое время суток.

КАК ПРОВОДИТЬ ТЕСТ

- Для проведения теста, откройте одну из закрытых упаковок, разорвав ее по указанной линии. Выньте тест для мочи.
- Одной рукой держите округленный конец прибора, второй снимите крышку с другого конца прибора сабсорбентом.
- Поверните конец с абсорбентом вниз; опустите его в струю мочи как минимум на 10 секунд, пока он не станет абсолютно влажным. При испускании мочи, не давайте моче перейти отметку-стрелку. Вы также можете собрать свою мочу в чистую емкость и опустить в нее конец с абсорбентом как минимум на 3 секунды.
- Наденьте на прибор крышечку и ждите появления цветных полосок. **Считайте результат в течение пяти минут. Не считывайте результат по истечении 5 минут.**



КАК СЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отрицательный результат (нет прироста ЛГ): в контрольной зоне появилась всего одна цветная полоска либо тест-полоска, но она светлее контрольной полоски. Это означает отсутствие прироста ЛГ.

Положительный результат (есть прирост ЛГ): если видны две цветные полоски, а тест-полоска по цвету одинакова или темнее контрольной полоски, возможно, в течение следующих 24-48 часов у Вас начнется овуляция. Если вы пытаетесь забеременеть, лучше всего будет, если половой акт состоится через 24 часа, но не позднее, чем через 48 часов.

Непригодный результат: цветная полоска вообще не видна. Повторите тест с новым тест-комплектом. Если тест опять не получается, свяжитесь с распространителем данного продукта и сообщите ему номер партии.



ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тест работает только в случае соблюдения инструкции по применению.
- Данный тест нельзя использовать в качестве контрацептива.
- Если у Вас нерегулярный или слишком продолжительный цикл, проконсультируйтесь с врачом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ТЕСТА

Тест на овуляцию *Maria Before Baby* определяет ЛГ в моче человека на уровне выше, чем 25 mSV/ml. Процент точности тестов – 99,8%.

ВЕЩЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕСТ

Отрицательному ЛГ и положительному ЛГ образцу были добавлены следующие вещества, потенциально влияющие на тест:

ацетаминофен	20 мг/дл	гентизиновая кислота	20 мг/дл
ацетилсалicyловая кислота	20 мг/дл	глюкоза	2 г/дл
аскорбиновая кислота	20 мг/дл	гемоглобин	20 мг/дл
атропин	20 мг/дл	тетрациклин	20 мг/дл
кофеин	20 мг/дл	ампициллин	20 мг/дл

Ни одно из веществ в указанной концентрации не влияло на тест.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Между контрольными полосками двух разных тестов видна большая разница. Нужно ли об этом беспокоиться?** Нет. Отличающийся цвет контрольных полосок не повлияет на результат теста. Необходимо сравнивать только цвет тест-полоски с цветом контрольной полоски на одном приборе в день проведения теста.

- Можно ли интерпретировать результаты теста, если прошло более пяти минут?** Нет. Результаты теста должны быть считаны в течение 5 минут. Несмотря на то, что положительный результат в принципе не должен меняться в течение нескольких минут, отрицательный результат может в течение нескольких минут после окончания тест-периода поменяться на недостоверный положительный результат, и это не будет точным показателем. Лучше всего всегда считывать результаты на пятой минуте тест-периода и потом выбросить тест, чтобы не спутать результаты.

- В течение какого времени необходимо делать тесты?** Делайте по 1 тесту каждый день, пока не определится максимальный уровень ЛГ. Как правило, в течение одного цикла необходимо сделать 3-6 тестов.

- В течение тест-периода в зоне результатов появилась розовая фоновая цвета вертикальные полоски. Нужно ли об этом беспокоиться?** Нет. Химический состав каждой пробы мочи и влажность воздуха в помещении, в котором проводится тест, будут отличаться. Из-за подобных изменений физического состояния могут появляться вертикальные полоски и/или розовый фоновый цвет, но это не влияет на результаты теста. Если контрольная полоска появилась в течение нескольких минут, тест работает правильно.

- Влияют ли на тест алкоголь и обыкновенные лекарства?** Нет. Но если вы принимаете какие-либо лекарства, лучше проконсультироваться с врачом.

- Если результат положительный, какой период является самым благоприятным для полового акта?** Овуляция может начаться в течение 24-48 часов. Этот период будет для Вас самым fertильным. Половой акт рекомендуется совершить в пределах этого периода.

- В данный момент я применяю метод базальной температуры (БТ). Заменяет ли тест на овуляцию методом БТ?** Повышение базальной температуры тела главным образом указывает на то, что овуляция уже началась. А тест на овуляцию определяет ее возможное начало.

- У меня был положительный результат и половой акт в течение благоприятных дней. Я не забеременела. Что делать?** На Вашу способность забеременеть могут влиять различные факторы. Возможно, Вам стоит пользоваться тест-комплектами в течение 3-4 месяцев. Если Вам не удалось забеременеть, Вам и Вашему партеру лучше проконсультироваться с врачом.

- Влияет ли на результаты теста количество выпитой моей жидкости?** Советуем за два часа до взятия мочи ограничить прием жидкости. Прием жидкости в большем количестве разжижит гормон в Вашей моче.

[IVD]	Использовать для диагностики <i>in vitro</i>	Хранить при температуре 4°C~30°C
[Инструкция по применению]		Производитель
[EC REP]	Уполномоченный представитель в ЕС	Не использовать повторно
[LOT]	Партия	Использовать до
[REV]	Номер ревизии	EXP
[CE 0537]	Данный продукт соответствует требованиям Директивы 98/79/ЕС по медицинским средствам диагностики <i>in vitro</i>	

Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No. 8, Lizishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Гуанджоу, Китай.

EC REP: Pilnvaroais pārstāvis ES: Qarad b.v.b.a., Cipalstraat 3, B-2440 GEEL, Бельгия.

Распространитель: SIA "ELVIM", Kurzemes prospekts 3G, Riga, LV-1067, Латвия. Тел.: +371 67 808440.

CE 0537